



Bionorica®

Лекарственный растительный препарат

Канефрон® Н

для лечения и профилактики
острых и хронических
рецидивирующих инфекций
мочевыводящих путей, а также
мочекаменной болезни (МКБ)



- Способствует уменьшению болей и резей при мочеиспускании
- Уменьшает количество повторных обострений
- Повышает эффективность антибактериальной терапии

сделано в Германии

ФОРМА ВЫПУСКА	Способ применения и дозы
КАНЕФРОН® Н, РАСТВОР ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ 	ДЕТИ ОТ 1 ГОДА ДО 6 ЛЕТ: ПО 15 КАПЕЛЬ 3 РАЗА В ДЕНЬ ДЕТИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ПО 25 КАПЕЛЬ 3 РАЗА В ДЕНЬ
КАНЕФРОН® Н, ТАБЛЕТКИ П/О* 	ДЕТИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ПО 1 ТАБЛЕТКЕ 3 РАЗА В ДЕНЬ

После ослабления остроты заболевания лечение следует продолжать 2–4 недели.

* Покрываемые оболочкой.

ООО «Бионорика»

Тел./факс: (495) 502-90-19

www.bionorica.ru

1. Горяинова А.Н., Захарова И.Н., Коровина Н.А., Мумладзе Э.Б. Инфекции мочевой системы у детей: современные подходы к диагностике и лечению. РМЖ. 2007. Т. 15. №21. С. 1533–1543.

2. Эрман М.В. Фитотерапия в лечении инфекции мочевой системы у детей. Эффективная фармакотерапия. 2014. №16. С. 18–22.



Bionorica®

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) –

самая распространенная
детская патология
после острых
респираторно-вирусных
инфекций (ОРВИ)



Группы повышенного риска развития ИМП при ОРВИ¹

Дети:



с нарушениями уродинамики (мочевая обструкция): аномалии развития мочевой системы, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, нефроптоз, мочекаменная болезнь и др.;



с возможной генетической предрасположенностью: инфекция органов мочевой системы (ОМС), аномалии развития ОМС, пузырно-мочеточниковый рефлюкс и др. у родственников;



с нарушениями обмена в мочевой системе: глюкозурия, гиперурикемия, дисметаболическая нефропатия и др.;



с запорами и хроническими заболеваниями кишечника;



с нарушениями моторики мочевых путей (нейрогенные дисфункции);



подвергшиеся действию ятрогенных факторов: госпитализации, инструментальным методам исследования ОМС, лечению стероидами и цитостатиками;



со сниженной общей и местной резистентностью: недоношенные дети, часто болеющие дети, дети с системными или иммунными заболеваниями и др.;



с ИМП в анамнезе

**У детей группы риска эпизод ОРВИ
может спровоцировать развитие ИМП**

С целью профилактики ИМП

при острой респираторной инфекции детям группы риска по ИМП целесообразно назначить **Канефрон® Н** на 10–14 дней