

# АЛГОРИТМ ВЫБОРА ДЕТЯМ АНТИДИАРЕЙНОГО СРЕДСТВА



## НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО:

**1** **ЛОПЕРАМИД** **6+** ПРОТИВОПОКАЗАН ДЕТЯМ **ДО 6 ЛЕТ**<sup>1</sup>

**2** **ДИОСМЕКТИТ** НЕ РЕКОМЕНДОВАН К ПРИМЕНЕНИЮ **У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 2-Х ЛЕТ**<sup>2</sup>



В соответствии с новыми международными рекомендациями препараты на основе глины – **диосмектит**, полученные из почвы, могут содержать **тяжелые металлы**, в том числе **свинец**.

**Российские педиатры** проинформированы о том, что **не рекомендуется применять препараты на основе диосмектита (Смекта и дженерики) у детей младше 2-х лет** из-за возможности поступления в организм свинца<sup>2</sup>.

## **3** ЭНТЕРОСОРБЕНТЫ:

- Оказывают медленный клинический эффект (лишь **на 3 сутки** приёма), а маленьким детям надо быстро устранить диарею, чтобы не развилось обезвоживание<sup>3</sup>
- Вызывают реактивные запоры<sup>4</sup>
- Нарушают всасывание других препаратов<sup>4</sup>
- Сложный прием из-за неприятного вкуса и большого объема<sup>4</sup>, которые могут вызвать у ребенка рвоту

## **4** НИФУРОКСАЗИД

- Только при бактериальной диарее (**не более 20% от всех диарей**)<sup>5</sup>
- Не останавливает потерю воды, рекомендован только в составе комплексной терапии<sup>5</sup>
- Противомикробное средство, требует курсового приема (до 7 дней)<sup>5</sup>
- Не включен в мировые рекомендации<sup>6,7</sup>
- В Европе с 2003 года разрешён только **с 2-х лет по рекомендации врача**
- Французское агентство по безопасности фармацевтических препаратов (ANSM) с 2019 г. **не рекомендует использовать нифуроксазид у детей в возрасте до 18 лет**, из-за серьезных побочных эффектов иммуноаллергического характера<sup>8</sup>.

**АДИАРИН® (ЖЕЛАТИНА ТАННАТ) –  
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ БЫСТРОГО И БЕЗОПАСНОГО  
УСТРАНЕНИЯ ДИАРЕИ У ДЕТЕЙ!**



1. Инструкция по медицинскому применению препарата Лоперамид

2. <https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Medicaments-a-base-d-argile-dans-le-traitement-symptomatique-de-la-diarrhee-aiguee-chez-l-enfant-Lettre-aux-professionnels-de-sante>

3. Инструкция по медицинскому применению препаратов Смекта, Энтеросгель, Полисорб МП

4. Горелов А.В., Плоскирева А.А. Сорбционная и цитомонопротективная терапия острых кишечных инфекций / Доктор. Ру 2016 (123). Стр. 20-23

5. Инструкция по медицинскому применению препарата Энтерофурил (нифуроксазид)

6. A. Guarino et al. Evidence-Based Guidelines for Management of Gastroenteritis. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases Evidence-Based Guidelines for the Management of Acute Gastroenteritis in Children in Europe: Update 2014

7. Глобальные практические рекомендации Всемирной Гастроэнтерологической организации. Острая диарея у взрослых и детей: глобальная перспектива. WGO, 2012

8. <https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Le-nifuroxazide-Ercefuryl-et-ses-generiques-ne-doit-plus-etre-utilise-chez-les-enfants-et-adolescents-de-moins-de-18-ans-et-est-desormais-delivre-uniquement-sur-ordonnance-Point-d-information>

# АДИАРИН®

(ЖЕЛАТИНА ТАННАТ) –

**ИДЕАЛЬНОЕ СРЕДСТВО  
ДЛЯ ОСТАНОВКИ ДИАРЕИ У ДЕТЕЙ**



- Имеет растительное происхождение
- Не содержит соли тяжелых металлов
- Полностью безопасен для детей



**ПОМОГАЕТ ПРИ ДИАРЕЕ ЛЮБОГО ТИПА:  
вирусной, бактериальной, пищевом отравлении**

Адиарин® создает на поверхности слизистой кишечника **специальный защитный биобарьер**, который препятствует её контакту с бактериями, вирусами и токсинами.



**ПРЕДУПРЕЖДАЕТ РАЗВИТИЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ**

Закрывает разрушенные воспалением межклеточные соединения кишечного эпителия и нормализует процесс всасывания воды.

- Доказанный антидиарейный эффект в течение **первых 12 часов!**<sup>1</sup>
- Особенно рекомендован к применению у детей в возрасте до 3 лет.<sup>2</sup>



**УДОБЕН В ПРИМЕНЕНИИ, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ**

- 1 саше разводится в ложке с водой!

Не имеет вкуса, не вызывает дискомфорта при приеме.



**ДИОСМЕКТИТ 3 Г**



**ЖЕЛАТИНА ТАННАТ 0,25 Г**



**АДИАРИН® - БЫСТРЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ И ПРОСТОЙ В ПРИМЕНЕНИИ**

**WWW.ADIARIN.RU**

1. Наблюдательное проспективное исследование с участием 2 когорт пациентов с острой диареей, принимавших желатина таннат, с оценкой показателей через 0 и 12 часов от момента начала (результаты этих двух исследований представлены на конференции sed - semana de las enfermedades digestives 15-19 июня 2007 г. в Мадриде)

2. Tasectan™ (gelatine tannate) for the treatment of acute gastroenteritis in children: preliminary results from a study conducted to evaluate its efficacy and safety, allegriani a1, costantini m2 Oncology and eurosciences department - ss annunziata hospital of chieti, italia; Zpharmacy department - g. mazzini hospital of teramo, italia.



ООО «ЯДРАН», 119330, Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф. VII. Тел.: +7 (499) 143 3371. jadran@jgl.ru, www.jgl.ru  
РУ: Адиарин®, изделие медицинское для защиты слизистой оболочки кишечника, №РЗН 2017/5412 от 21.02.2017 г.  
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ  
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ